

一度に

がんの可能性と糖尿病の発症リスクを評価

アミノインデックス®リスクスクリーニング検査 (AIRS®)



検査の対象と検査前の注意事項

評価項目		対象年齢	価格
男性	がんの可能性	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん	24,840 (税込)
	糖尿病リスク	4年以内に糖尿病を発症するリスク	
	アミノ酸レベル	血液中の必須・準必須アミノ酸の濃度レベル	
女性	がんの可能性	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮・卵巣がん	
	糖尿病リスク	4年以内に糖尿病を発症するリスク	
	アミノ酸レベル	血液中の必須・準必須アミノ酸の濃度レベル	

※前立腺がんは40~90歳
※子宮・卵巣がん20~80歳

料金は消費税法令の改正に伴い、改正される場合があります。

※検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者（治療中を含む）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、数値に影響が出ますので、検査は受けられません。
※糖尿病の方（治療中を含む）でも結果が出力されますが、糖尿病リスク値やランク評価、検査結果に基づくタイプについては評価対象外となります。

食事

検査前8時間は
水以外は



検査前8時間以内に、水以外（食事、サプリメント等）は摂らないでください。

運動

当日朝は



正しい検査結果を得るために、検査当日朝の運動はお控えください。

お薬

事前に相談を



薬剤の検査への影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医にご相談の上、その指示に従ってください。

- この検査は、がんである可能性を評価する検査で、がんであるか否かをはっきりと判断するものではありません。ランクAでもがんでないとは言いきれません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。
- この検査は、採血を行った時の、がんである可能性を評価する検査です。生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。この検査は、その他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。
- 子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできませんが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
- この検査は生涯にわたっての糖尿病リスクを予測するものではありません。なお、ランクAでも100%4年以内に糖尿病を発症しないとは言いきれません。ランクBやCであっても必ず4年以内に糖尿病を発症するというものではありません。

お問い合わせ

TEL : 082-232-6150

(健康管理センター直通)



地方独立行政法人 広島市立病院機構

広島市立舟入市民病院

Hiroshima City Funairi Citizens Hospital

〒730-0844 広島市中区舟入幸町14番11号